

# رویش با اعمال نیرو (Forced Eruption) : معرفی موارد

دکتر شریعه فقیهی متخصص پریودنلولژی، استادیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر مهرداد لطف‌آذر متخصص پریودنلولژی، استادیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

## خلاصه

حفظ و ترمیم دندان‌های منفردی که در ناحیه اپیکالی کرست استخوان آلوئول بعلل مختلف مانند پوسیدگی، شکستگی تاج، پروفوریشن و یا تحلیل خارجی دچار آسیب شده اند براحتی میسر نمی‌باشد. در این موارد دندانپزشک می‌بایست در مورد حفظ ریشه دندان یا کشیدن آن تصمیم گیری کند. درمان‌های انتخابی بدنبال کشیدن ریشه شامل جایگزینی دندان از دست رفته با انواع پروتز یا ایمپلنت می‌باشد اما در صورتیکه حفظ ریشه دندان موردنظر باشد درمان‌های انتخابی شامل جراحی افزایش طول تاج کلینیکی (orthodontic forced eruption) و یا (crown lengthening) می‌باشد. جراحی forced eruption بخصوص در ناحیه قدامی بالا از نظر تامین زیبایی با مشکلات قابل توجهی همراه است. انجام جراحی پریودنلال جهت افزایش طول تاج دندان و برقراری عرض بیولوژیک، مستلزم برداشتن مقدار زیادی استخوان پشتیبان از دندان‌های مجاور است. لذا در این موارد forced eruption (F.E) عنوان یک درمان انتخابی مطرح می‌باشد(۱-۴).

بر اساس وضعیت کلینیکی دندان و اهداف درمانی موردنظر، دندانپزشک می‌تواند از F.E. همراه با supracrestal fibrotomy و F.E. بدون فیبروتومی استفاده کند (۵-۷). این مقاله به معرفی دو مورد کلینیکی در این زمینه می‌پردازد.

## بیمار اول:

مجدد و پس از برطرف نمودن التهاب با استفاده از سیم استیل  $0.9$  میلیمتر یک post دارای قلاب در کanal دندانی آماده شده سمان گردید.


با استفاده از تکنیک wire & composite انکورج مناسب از دندان های کائین تا کائین فک بالا گرفته شد. سیم افقی تا حد ممکن به لبه انسیزالی نزدیک بود و با دو خم در ناحیه ریشه دندان شماره  $8$  کاملاً از بالای قلاب موردنظر عبور می کرد. نیروی رویش با استفاده از elastic band  $2 \frac{1}{2}$  oz ( $Dentaurum$  light  $3/16$ ) اعمال گردید (تصویر شماره ۱-ب). این الاستیک ها هر هفته تعویض می شدند. با اعمال نیروی سبک و مداوم در مدت  $8$  هفته سه بار عمل فیبروتومی انجام گردید تا از رسوب استخوان در کرست آلوئول جلوگیری گردد.

تصویر شماره ۱-ج نشان می دهد که در پایان این دوره با انجام فیبروتومی مارژین بافت نرم حرکت کرونالی قابل توجهی نکرده است. (قابل مقایسه مربوط به بیمار دوم که حرکت کرونالی مارژین لش ای بدنبال F.E. بدون فیبروتومی را نشان می دهد).


چهار هفته بعد از پایان F.E. (رسیدن قلاب به سیم افقی) اقدام به جراحی فلپ به منظور recontouring لش و استخوان آلوئول گردید. خط برش از مزیال دندان لترال سمت چپ تا مزیال کائین سمت راست را شامل می شد. این برش بجز روی دندان شماره  $8$  بصورت سالکولار داده شد. در دندان مورد نظر برش یک میلیمتر زیر مارژین لش ای انجام گردید. بعد از کنار زدن فلپ، در ناحیه

بیمار پسری  $11$  ساله بدون مشکل سیستمیک با شکستگی تاج دندان شماره  $8$  است که در سال  $1376$  مورد معاینه قرار گرفت. والدین بیمار در بیان تاریخچه حادثه اظهار داشتند که حدود  $9$  هفته قبل بر اثر ضربه دچار شکستگی دندان شده و بعلت درد شدید به یک کلینیک مراجعه و درمان ریشه (R.C.T) برای فرزندشان انجام گردید ولی بعد از برطرف شدن درد بعلت امتحانات مدرسه برای ادامه درمان مراجعه نکردند. در طول چند روز گذشته به چند مرکز جهت درمان مراجعه کرده ولی به نتیجه نرسیدند و در نهایت بعلت پوسیدگی و شکستگی عمیق ریشه، کشیدن دندان به آنها پیشنهاد شده بود. در بررسی کلینیکی مدخل کanal بدون پانسمان و ریشه دچار پوسیدگی شده بود. خط شکستگی تاج بطرف مزیوپالاتال متمایل بود. (تصویر شماره ۱-الف).


عمیق ترین ناحیه شکستگی حدود  $2$  میلیمتر زیر کرست استخوان قرار داشت بنابراین با انجام جراحی افزایش طول تاج می باشد حداقل  $5$  میلیمتر استخوان از این ناحیه برداشته می شد تا به حداقل میزان قابل قبول نسج سالم دندان، خارج از استخوان از سمت مزیال دندان شماره  $8$  برسد. این عمل مستلزم انجام استئوکتونی بسیار زیادی بر روی دندان های مجاور می شد و اجرای آن بر روی دندان های سانترال فک بالا از نظر زیبایی مشکلات قابل توجهی برای بیمار ایجاد می کرد. با توجه به مشکلات ذکر شده و با توجه به سن بیمار بهترین انتخاب در این مورد F.E. بود. لذا بعد از برداشتن پوسیدگی ها و انجام R.C.T.




تصویر شماره ۱-د) : پس از کتار زدن فلاب و انجام استئوتومی



تصویر شماره ۱-الف) : وضعیت دندان ۸ در مراجعه اولیه




تصویر شماره ۱-ه) : ناحیه جراحی پس از انجام بخیه



تصویر شماره ۱-ب) : پس از قراردادن Post داخل کانال و  
Elastic band



تصویر شماره ۱-ی) : یکسال بعد از درمان و گذاشتن روكش



تصویر شماره ۱-ج) : پس از اتمام حرکت ارتودنسی

مدت ۸ هفته به میزان ۴ میلیمتر اسکترود شد.  
(تصاویر شماره ۲-ب تا ه)

افزایش میان لثه کراتینیزه و حرکت کرونا لی مارژین لثه در تصاویر قابل توجه است. پس از انجام یک دوره stabilization دو ماهه، جراحی افزایش طول تاج با انجام استئوکتومی جزئی از دندان های مجاور قابل اجرا گردید. شروع استخوان سازی و ترابکولاسیون در ناحیه آپکس دندان در رادیوگرافی مشاهده شد. دو ماه بعد، دندان موردنظر با core & post و روکش چینی بازسازی شد (تصویر شماره ۲-ی).

## بحث و نتیجه گیری


جراحی افزایش طول تاج کلینیکی بخصوص در ناحیه دندان های قدامی فک بالا، معمولاً از نظر تامین زیبایی با مشکلات قابل توجهی همراه است. استفاده از تکنیک F.E. همواره نیاز به درمان جراحی را برطرف نمی کند اما می تواند زیبایی بیشتر را تامین نماید. تکنیک wire & composite رو شی ساده، ارزان و قابل اجرا برای همکاران دندانپزشک می باشد. انجام F.E. همراه با فیبروتومی در مواردی که در اطراف ریشه دندان تحلیل عمودی استخوان وجود نداشته باشد یا تغییر در موقعیت مارژین لثه ای مورد نظر نباشد، پیشنهاد می شود. در مواردی که در اطراف ریشه دندان، تحلیل عمودی استخوان وجود دارد و یا حرکت کرونا لی مارژین لثه ای موردنظر باشد تکنیک F.E. بدون فیبروتومی پیشنهاد می شود.<sup>(۲ و ۳ و ۴)</sup> با استفاده از تکنیک wire & composite

مزیوپالاتال دندان مورد نظر احتیاج به یک میلیمتر استئوکتومی وجود داشت. پس از انجام استئوکتومی و استئوپلاستی فلپ بخیه شد و پس از انجام فرنکتومی، ناحیه پانسمان گردید. (تصاویر شماره ۱-د و ه) چهار هفته بعد از انجام جراحی یعنی پس از یک دوره ۸ هفته ای stabilization استخوان سازی و ترابکولاسیون استخوان در ناحیه آپکس دندان شماره ۸ در رادیوگرافی مشاهده شد.


در این هنگام سیم افقی و کامپوزیت برداشته شد و یک ماه بعد از آن دندان موردنظر با core & post بازسازی و سپس روکش شد. ارزیابی کلینیکی یکسال بعد از گذاشتن روکش یک میلیمتر افزایش در عرض ناحیه کراتینیزه را نشان داد. (تصویر شماره ۱-ی)

## بیمار دوم:

بیمار پسری ۱۳ ساله است که در سن ۱۰ سالگی بعلت ضربه دچار شکستگی دندان های شماره ۷ و ۸ شده است. پس از درمان ریشه و ترمیم تاج این دندان ها، تاج دندان شماره ۸ بعلت یک ضربه دیگر در سن ۱۲ سالگی مجدداً دچار شکستگی شده و بعلت عدم وجود درد بعد از یکسال با پوسیدگی شدید ریشه در سال ۱۳۷۶ مراجعه و مورد معاينه قرار گرفت (تصویر شماره ۲-الف). بعد از برداشتن پوسیدگی ها، لبه شکستگی در مزیال و مزیوباکال حدود ۲/۵ میلیمتر زیر لبه استخوان ناحیه قرار داشت. در صورت انجام جراحی افزایش طول تاج کلینیکی، می باشد حدود ۵/۵ میلیمتر استئوکتومی در ناحیه انجام می گردید. دندان موردنظر در




تصویر شماره ۲-د) : رادیوگرافی قبل از درمان




تصویر شماره ۲-الف) : دندان ۸ در مراجعه اولیه




تصویر شماره ۲-ه) : رادیوگرافی دو ماه پس از اتمام F.E



تصویر شماره ۲-ب) : پس از قراردادن Post داخل کاتال و Elastic band



تصویر شماره ۲-ی) : شش ماه پس از درمان و گذاشتن روکش



تصویر شماره ۲-ج) : پس از اتمام حرکت ارتودنسی

دندان یا ریشه‌های غیرقابل ترمیم مانند موارد فوق بازسازی تاج این دندان‌ها به منظور برقراری فانکشن و زیبایی مناسب آنهاست. در بیشتر موارد این دندان‌ها در نهایت با روکش‌های چینی بازسازی خواهد شد. بسیاری از متخصصین پریودنтолوژی اتفاق نظر دارند که حداقل ۳ میلیمتر لشه چسبنده و بطور کلی ۵ میلیمتر لشه کراتینیزه در اطراف دندان‌های روکش شده بخصوص اگر پایه پروتز قرار گیرند لازم است. بنابراین موردی را در نظر می‌گیریم که دندانی با لشه کراتینیزه نازک و عرض حدود ۲-۳ میلیمتر دچار شکستگی شده و جهت ترمیم آن جراحی افزایش طول تاج کلینیکی احتیاج است. در این مورد دو حالت کلی قابل تصور است: حالت اول اینکه ملاحظات زیبائی بعنوان اولین فاکتور مورد توجه نباشد. در این حالت بعد از انجام جراحی افزایش طول تاج، نیاز به انجام پیوند لشه برای ایجاد عرض کافی لشه چسبنده محتمل خواهد بود. اما چنانچه زیبایی اولین فاکتور مورد توجه باشد (حالت دوم) می‌توانیم با انجام F.E. بدون فیبروتومی میزان استئوکتونی از دندان‌های مجاور را به حداقل رسانده و با اپیکالی کردن لشه کراتینیزه افزایش یافته، نیاز به جراحی پیوند لشه را مرتفع کنیم. بنابراین در مواردی که کاهش عرض لشه همراه با نیاز به جراحی افزایش طول تاج کلینیکی وجود دارد F.E. بدون فیبوتومی می‌تواند انتخابی مناسب باشد.

استفاده از نیروهای light (slow eruption) منطقی تر بنظر می‌رسد. چنانچه طرح درمان بصورت accelerated forced eruption یا rapid eruption باشد انجام فیبروتومی ضروری است.<sup>(۶,۷,۸)</sup> slow eruption با یا بدون فیبروتومی قابل اجراست. گاه می‌توان حتی در یک سمت از دندان فیبروتومی را انجام داد و در سمت دیگر الیاف بافت همبندی را قطع نکرد. در slow eruption فاصله C.E.J. تا کرست استخوان در طی مراحل F.E. همواره ثابت باقی می‌ماند ولی در rapid eruption این فاصله بعلت فیبروتومی و در نتیجه عدم حرکت کرونالی کرست استخوان، افزایش می‌یابد. در بیمار شماره ۱ علیرغم سه بار فیبروتومی در مدت ۸ هفته، مقداری حرکت کرونالی کرست استخوان و مارژین لشه ای مشاهده شد. این یافته بیانگر طولانی بودن فواصل بین فیبروتومی‌ها می‌باشد. در یک مطالعه بر روی سگ با انجام فیبروتومی به فواصل ۱۴ روز، از حرکت کرونالی استخوان و مارژین لشه ای جلوگیری بعمل آمده است. لذا این گروه محققین انجام فیبروتومی به فواصل دو هفته را پیشنهاد کرده اند.<sup>(۹)</sup> با این وجود بیشتر محققین بر اجرای فیبروتومی به فواصل ۷-۱۰ روز تاکید دارند.<sup>(۱۰)</sup> توجه به افزایش عرض لشه کراتینیزه بدنبال F.E. بدون فیبروتومی از جهات مختلف می‌تواند مورد تامل واقع شود. هدف نهایی از F.E.

## **Abstract**

---

### **Forced Eruption : Case Reports**

**Sh. Faghihi:** Assistant professor, Periodontics Department, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences.

**M. Lotfazar:** Assistant professor, Periodontics Department, Dental School, Hamadan University of Medical Sciences.

Restoration of severely damaged teeth requires comprehensive, carefully planned pretreatment. Usually, the teeth with fractures or caries extended upto or below the alveolar crest, can be treated by conventional surgical crown lengthening at the expense of supporting bone. Forced eruption or extrusion of teeth is an alternative procedure to overcome problems with dental esthetics and removing of supporting tissues.

Two case reports are used as a basis for reviewing the forced eruption with and without supracrestal fibrotomy.

---

## منابع

- 1- Hithersay G.S. combined endodontic-orthodontic treatment of treatment of transverse root fractures in the region of the alveolar crest. oral surgery 1973, 36: 404-415.
- 2- Ingber J. Forced eruption (I) A method of treating isolated 1and 2 wall infrabony osseous defects: rational and case report. J. Periodont. 1974,45:199-206.
- 3- Simon JHS. Root extrusion rational and technique, Dent. Clinic. Nor. Am. 1984, 28, 909.
- 4- فقیهی. ش. لطف آذر. م. رویش با اعمال نیرو در درمان‌های پریودونتال (مروری بر مقالات)، مجله جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران شماره ۳۴ منتشر خواهد شد.
- 5- Lindhe, J. Karring T. Lang N:Clinical periodontology and implant dentistry. 3ed. Munksgaard Co. 1998.P:653-657, 783-785.
- 6- Pontoriero, R. et al. Rapid extrusion with fiber resection: A combined orthodontics periodontic treatment modality. Int. J. Periodont. Rest. Dent. 1987;7:30-43.
- 7- Kozlovsky A. Tal H. Lieberman M: Forced eruption combined with gingival fibrotomy. A technique for clinical crown lengthening. J. Clin. Periodontal, 1988; 15: 534-538.
- 8- Bongert JS. Accelerated forced eruption as a preparatory measure for the restorations of severely damaged maxillary incisors. Quintessence international, 1991, 22;6, P: 425.
- 9- Berglundh T. et al. Periodontal tissue reaction to orthodontic extrusion. An experimental study in the dog. J. Clin periodon(1991) 18: 330-336.